Incontinenza urinaria maschile post-chirurgica: dalla diagnosi

alla terapia
UOC UROLOGIA Azienda Ospedaliera di Parma,
Presidio Ospedaliero di Fidenza-Vaio

Direttore: Dott. Andrea Prati

PARTE 1: Dalla Clinica alla Diagnostica

Dott. Michele Cotugno

DEFINIZIONE di INCONTINENZA URINARIA

**.QUALSIASI PERDITA INVOLONTARIA DI URINA
ATTRAVERSO L'URETRA (*International
Continence Society*)**

TIPOLOGIE (ICS: International Continence Society)

- .Incontinenza urinaria da SFORZO: **sforzo, esercizio fisico secondaria all'aumento della pressione endoaddominale in assenza di contrazioni detrusoriali** (colpi ti tosse, sternuti, m. valsava ecc)
- .Incontinenza urinaria da URGENZA: **accompagnata o immediatamente preceduta da stimolo minzionale non controllabile (urgenza); secondaria a contrazioni detrusoriali non inibibili** che superano la pressione di chiusura uretrale

EPIDEMIOLOGIA dell'IU

FEMMINILE

(Stroup et al. MOSE group. JAMA, 283: 2008,2000)

.INCONTINENZA URINARIA (qualsiasi perdita involontaria di urina): Prevalenza **37%** Incidenza **5-11 nuovi caso/1000/anno** dopo i 60 anni

.Incontinenza urinaria SEVERA (> 5 pannolini/die): **6-10%**

.IU da sforzo: **50%**

.IU mista: **30%**

.IU da urgenza: **16%**

.Altro: 4%

.Fattori di rischio: età, menopausa, gravidanza, parto, malattie neurologiche, isterectomia

EPIDEMIOLOGIA DELLA IU MASCHILE

(Temml et al: Urinary incontinence in both sexes: prevalences rates and impact of quality of life and sexual life. Neurourol Urodyn, 19: 259, 2000)

.INCONTINENZA URINARIA (qualsiasi perdita involontaria di urina):
Prevalenza **11-34%** dopo i 60 anni, Incidenza: poca letteratura ad oggi

.IU da URGENZA: 40-80% (IPB-LUTS)

.IU MISTA: 10-30%

.IU da SFORZO: 10%

.Fattori di rischio: Età, LUTS da IPB, malattie neurologiche,
prostatectomia radicale

FISIOLOGIA DELLA MINZIONE

RIEMPIMENTO VESCICALE

.CENTRO PONTINO della Minzione INIBITO

.SNA SIMPATICO +++++

.SNA PARASIMATICO +

.Inibizione del Detrusore (rec. Beta); Aumento del tono muscolatura liscia del collo vescicale e dell'uretra prossimale-intermedia/sfintere uretrale prossimale (rec. Alfa adrenergici)

FASE DI SVUOTAMENTO

.CENTRO PONTINO DELLA MINZIONE

ATTIVATO dalla PAG (Sostanza Grigia Periacqueduttale): Capacità vescicale >450-500 ml per stiramento soglia dei tensocettori e nocicettori

.SNA PARASIMPATICO +++++

.SNA SIMPATICO +

**.Contrazione Detrusoriale (recettori muscarinici),
rilasciamento dello sfintere uretrale prossimale
(recettori alfa adrenergici)**

CONTROLLO VOLONTARIO DELLA MINZIONE

- Sfintere URETRALE DISTALE (2 componenti: interna ed esterna)
- Componente interna (**rabdosfintere propriamente detto**): fibre a lenta contrazione (tipo 1) che mantengono il TONO MUSCOLARE con recettori colinergici (nervo pudendo + rami del plesso pelvico + influenze serotoninergiche e noradrenergiche sul nucleo di Onuf)
- Componente esterna (la parte piu' interna del diaframma urogenitale): fibre a veloce contrazione (tipo 2) del muscolo pubo coccigeo (nervo pudendo)

Incontinenza Urinaria Maschile da URGENZA (1)

- Forma più frequente (50% dei casi)
- Il 60% dei pazienti con IPB esibisce alla cistomanometria Iperattività Detrusoriale (Abramas et al. Detruor instability an blader outlet obstruction. Neurourol Urodyn, 1985. 4: p.317)
- I 2/3 di questi paziente dopo TURP mostrano scomparsa di iperattività detrusoriale (Abramas et al. Detruor instability an blader outlet obstruction. Neurourol Urodyn, 1985. 4: p.317)
- Altre cause: neuropatie, IVU, neoplasie, radioterapia oppure Iperattività Detrusoriale Idiopatica con Incontinenza
- La presenza o meno di Incontinenza associata ad urgenze dipenderà anche dalla PRESSIONE

Incontinenza Urinaria Maschile da URGENZA (2)

.OSTRUZIONE ALL'EFFLUSSO:

- 1. **Parziale denervazione colinergica detrusoriale (IPERSENSIBILITA' ad ACH e ATP)**
- 2. **Alterazioni nelle proprietà del muscolo Detrusore** (deterioramento della contrattilità ed alterazione delle proprietà elettriche delle cellule con instabilità di membrana)
- 3. **Espressione di NGF (Ipertrofia dei neuroni afferenti ed efferenti con conseguente riorganizzazione anomala del riflesso spinale**

INCONTINENZA DA URGENZA MASCHILE- CLINICA e DIAGNOSTICA

•Quasi sempre associata a **LUTS da IPB** (nicturia, pollachiuria, mitto ipovalido, mitto prolungato, esitazione preminzionale ecc)

•Inquadramento diagnostico:

- **Anamnesi** (escludere le altre cause secondarie: radioterapia, neuropatie, diuretici, FANS ecc) + **Diario Minzionale**
- **PSA, Esame Urine ed Urocoltura** (escludere IVU soprattutto se il paziente riferisce stranguria/ematuria/iperpriessia)
- **EDR** (presenza o meno di IPB o Prostatite)
- **Ecografia Reno-Vescicale + RPM** (fondamentali nell' IPB)
- **Citologia Urinaria su 3 campioni + eventuale Cistoscopia** (nel sospetto k vescicale: fumatore, > 50 anni, fatt. rischio lavorativi, anamnesi personale + per k vescicale ecc)
- **ESAME URODINAMICO** : nei casi dubbi per Iperattività

INCONTINENZA URINARIA MASCHILE DA SFORZO

• Circa il 10% delle IU nell'uomo

• Lesioni dello sfintere ureterale distale
(rabdofintere propriamente detto) dopo chirurgia
prostatica :

- TURP, HOLEP, PVP: 1% a 12 mesi (Van. Melick et al.
A randomized controlled trial comparing transurethral resection of the prostate, contact laser prostatectomy and electrovaporization in men with IPB: analysis of subjective changes, morbidity and mortality. J Urol, 169, 2003)
- Adenomectomia Prostatica Laparotomica: 3 %
a 12 mesi (International Continence Society Guidelines)
- PROSTATECTOMIA RADICALE: 10 -15 %
(media), (International Continence Society Guidelines 2016)

Incontinenza da Sforzo Post-Prostatectomia

•Continenza a 12 mesi (ICS Guideline 2016):

–Laparotomica: 60-90%

–Laparoscopica: 65-95%

–Robotica: 90-97%

–**Esperienza del Chirurgo**: Centri di Eccellenza PR Laparotomica e Laparoscopica, IU Significativa (> 2 pannolini/die) 5-10%

(Walsh et al: The status of radical prostatectomy in the United States in 1993: where do we go from here. Journal of Urology, 1993: p 622-)

–**Lesione alla componente muscolare e/o della componente nervosa (rami del. N Pudendo)** da cauterizzazione, trazione

IU da Sforzo Maschile (Clinica e diagnostica)

.Anamnesi (Perdita involontaria di Urina dopo sforzi a seguito di chirurgia prostatica!)

+ Diario Minzionale

.PAD TEST (1 ora: più utilizzato sec. ICS):

.- Lieve: perdite < 10 g

.- Moderata: perdite tra 11 e 50 g

.- Grave: > 50 g

.E.O: Stress Test positivo

.CISTOSCOPIA : Valutazione accurata dello

TAKE HOME MESSAGE

- 1. La prevalenza dell'IU nell'uomo va dal 11 al 34% dopo i 60 anni e la forma più frequente è la IU da URGENZA (40-80%)**
- 2. Causa più frequente di urge incontinence nell'uomo è l'IBP per alterazioni di contrattilità ed innervazione del muscolo detrusoriale**
- 3. Fondamentale risulta l'inquadramento clinico a 360° del paziente visto il complesso quadro sindromico che ne deriva (LUTS) e le diverse strategie terapeutiche possibili per l'IPB e l'urgenza + eventuale incontinenza ad essa**

TAKE HOME MESSAGE

- 6. IU da sforzo: 10% delle IU nell'uomo** (forma meno frequente)
- 7. Interventi disostruttivi prostatici (TURP ecc) RARAMENTE danno incontinenza: 1%**
- 8. La Prostatectomia Radicale: causa più frequente (10-15% prostatectomizzati) ma molto dipende dall'esperienza del chirurgo (casistiche operatorie) e dall'approccio chirurgico (robotica)**
- 9. Anamnesi + E.O (stress test) sono spesso dirimenti + conferma mediante cistoscopia ambulatoriale (presenza ed entità del deficit**