*AUSL DI PARMA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI FIDENZA – S. SECONDO PARMENSE
OSPEDALE VAIO
Direttore Prof. E. Vaienti*

LA COXALGIA EXTRA-ARTICOLARE: UNA DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Dott. Galeazzo Concari

ANCA DOLOROSA NON TRAUMATICA: EZIOLOGIA

- 1) Articolare
- 2) **Extra-articolare:** patologie di tessuti molli, muscoli, tendini, legamenti e borse
- 3) Sindromi da entrapment neurogeno e formazioni erniarie

L'ANCA DOLOROSA: EZIOLOGIA ARTICOLARE

- Displasia congenita
- M. di Perthes, epifisiolisi
- Osteoartrosi
- Patologie infiammatorie (AR, Artropatia psoriasica, condrocalinosi..)
- Sinovite transitoria
- Artrite settica
- Patologie vascolari (ON, Edema transitorio)
- Osteocondromatosi sinoviale
- Sinovite pigmentosa villonodulare
- Impingement Femoro Acetabolare
- Lesioni tumorali

ANCA DOLOROSA: CAUSE NON-ARTICOLARI

- Snapping hip syndrome
- Sindrome della fascia lata
- Borsiti:
 - Trocanterica
 - Ileopsoas
- Osteite pubica: pubalgie

SNAPPING HIP SYNDROME

Il termine “anca a scatto” (snapping hip syndrome) indica una patologia caratterizzata dalla sensazione di scatto a livello articolare che si associa a dolore.

In passato si credeva che la causa dello scatto fosse intrarticolare mentre attualmente si ritiene che nella stragrande maggioranza dei casi questa sia extrarticolare.

Si possono riconoscere tre tipi di anca a scatto:

- Laterale
- Anteriore
- Posteriore

ANCA A SCATTO LATERALE

È dovuta al brusco scavalcamento del margine posteriore del gran trocantere da parte del tendine del muscolo tensore della fascia lata e/o del margine anteriore del grande gluteo.

Generalmente si manifesta, durante un movimento di flessione dell'anca, con una brusca sensazione di scatto percepibile sulla regione trocanterica a cui può associarsi l'improvvisa comparsa di dolore più o meno intenso nella stessa sede.

ANCA A SCATTO ANTERIORE

È causata da un brusco scatto del tendine del muscolo ileopsoas sull'eminanza ileo-pettinea durante i movimenti di flesso-estensione dell'anca.

Questo tipo è stato scoperto di recente e sembra responsabile di un gran numero di scatti.

ANCA A SCATTO POSTERIORE

È molto rara ed è dovuta ad un brusco movimento che il capo lungo del bicipite femorale compie sulla tuberosità ischiatica.

In letteratura è stato descritto solo un caso

ANCA A SCATTO

Rimane una patologia poco studiata probabilmente a causa dell'esito benevolo che nella maggioranza dei casi la contraddistingue.

Deve essere considerata una patologia da sovraccarico che può colpire i praticanti di quasi tutti gli sport, ma soprattutto coloro che svolgono discipline nelle quali è richiesta una notevole mobilità dell'anca.

In ogni caso il riscontro che questa patologia tende a ridursi nelle fasce di età più avanzate fa pensare che:

- 1) questa affezione sia in stretto rapporto con la pratica sportiva e
- 2) che l'esito sia quasi sempre favorevole per il soggetto.

SINDROME DELLA FASCIA-LATA

Il dolore e' avvertito principalmente a livello della articolazione dell'anca e del Gran Trocantere

Il dolore inizia o peggiora a seguito di una particolare attivita' o trauma fisico

Tale sintomo può spesso portare a diagnosi erronee quali Borsite Trocanterica e/o coxartrosi

SINDROME DELLA FASCIA-LATA

Le funzioni del muscolo sono essenzialmente quelle di flessione dell'anca e del ginocchio, di stabilizzazione nella deambulazione e di abduzione e inversione dell'anca.

Il muscolo viene sovraccaricato nella corsa e nelle lunghe camminate specialmente in salita, oppure in attività che comportano ripetuta flessione dell'anca come le arti marziali, la danza e la ginnastica.

TRATTAMENTO

Indispensabili sono gli esercizi di stretching

Evitare fattori perpetuanti quali dormire o sedere con le ginocchia vicine al petto, correre su superfici oblique, correre con scarpe consumate ai lati, ripetere in maniera eccessiva e violenta senza opportuno riscaldamento, movimenti di sollevamento del ginocchio in avanti o diagonalmente (p.es. calci frontali nelle arti marziali)

BORSITE TROCANTERICA

E' un processo infiammatorio a carico della borsa sinoviale del grande trocantere del femore.

La borsite trocanterica interessa i soggetti di mezza età e gli anziani, colpisce più frequentemente le donne e i soggetti con squilibri posturali, ad esempio inclinazione del bacino o dismetria degli arti inferiori o anomalie della deambulazione.

BORSITE TROCANTERICA

Il soggetto affetto da borsite trocanterica avverte dolore nella zona superiore esterna del femore, soprattutto alla palpazione o digitopressione, durante la corsa e nei cambi di direzione.

In fase acuta è possibile che il paziente zoppichi e faccia fatica a deambulare e fare le scale. I movimenti senza carico sono dolenti nell'adduzione e nella flessione dell'anca oltre l'angolo retto, è possibile una limitazione dell'ampiezza del movimento.

Il dolore può essere anche notturno, soprattutto se si dorme sul lato malato. Le fitte si possono avvertire a livello del gluteo, non in area inguinale o nella zona interna della coscia.

DIAGNOSI

CILINICA: Esame Obiettivo ed Anamnesi

dolore alla palpazione e digitopressione in sede trocanterica

dolore all'adduzione e alla flessione dell'anca oltre l'angolo retto,
articolari passiva ed attiva limitata.

dolore notturno, se si dorme sul lato malato

STRUMENTALE:

RX

ECOGRAFIA

RMN

RX STANDARD

asperita' trocanterica

ECOGRAFIA

borsite

RMN

Esame altamente preciso

1.5T PHILIPS-1828653

Ex: 1257904

STIR longTE

Se: 501/5

Im: 20/30

Cor: P21.5 (COI)

Mag: 1.1x

R_a

ET: 14

TR: 8201.5

TE: 60.0

SENSE-Body

4.0thk/0.8sp

Id:DCM / Lin:DCM / Id:ID

W:572 L:246

Poliambulatorio Dalla Rosa Pra

LANATI STEFANIA

1953 Mar 28 F ASLTRAS000437769

Acc: 1661037

2011 Oct 27

Acq Tm: 14:37:52.53

320 x 252

L_r

DFOV: 35.8 x 35.8cm

Donna di 48aa sportiva: maratoneta

1.5T PHILIPS-1828653

Ex: 1257904

STIR longTE

Se: 501/5

Im: 21/30

Cor: P26.3 (COI)

Mag: 1.1x

R_a

ET: 14

TR: 8201.5

TE: 60.0

SENSE-Body

4.0thk/0.8sp

Id:DCM / Lin:DCM / Id:ID

W:572 L:246

Poliambulatorio Dalla Rosa Pra

LANATI STEFANIA

1953 Mar 28 F ASLTRAS000437769

Acc: 1661037

2011 Oct 27

Acq Tm: 14:37:52.53

320 x 252

L_r

DFOV: 35.8 x 35.8cm

1.5T PHILIPS-1828653

Ex: 1253461

PDW_SPAIR

Se: 701/6

Im: 14/24

Cor: A17.5 (COI)

Mag: 0.9x

R_A

ET: 22

TR: 2819.2

TE: 30.0

SENSE-Body

4.5thk/1.0sp

Id:DCM / Lin:DCM / Id:ID

W:723 L:416

S

Poliambulatorio Dalla Rosa Pra

LUCA CORINA

1942 Dec 11 F ASLTRAS000156295

Acc: 1655365

2011 Oct 25

Acq Tm: 11:11:31.81

404 x 297

L_r

DFOV: 43.1 x 43.1cm

1.5T PHILIPS-1828653

Ex: 1253461

PDW_SPAIR

Se: 801/6

Im: 25/46

Ax: I15.2 (COI)

Mag: 0.9x

R_A

ET: 20

TR: 5124.5

TE: 30.0

SENSE-Body

3.6thk/0.8sp

Id:DCM / Lin:DCM / Id:ID

W:639 L:367

A_r

Poliambulatorio Dalla Rosa Pra

LUCA CORINA

1942 Dec 11 F ASLTRAS000156295

Acc: 1655365

2011 Oct 25

Acq Tm: 11:15:24.03

368 x 280

L

P_r

DFOV: 43.2 x 43.2cm

Uomo di 59aa sportivo stagionale:
caduta sugli sci

1.5T PHILIPS-1828653
Ex: 1343907
PDW_SPAIR
Se: 401/5
Im: 12/25
Cor: P3.1 (COL)

Mag: 1.1x

R_a

ET: 22
TR: 3053.9
TE: 30.0
SENSE-Body
4.5thk/1.0sp
Id:DCM / Lin:DCM / Id:ID
W:525 L:302

Poliambulatorio Dalla Rosa Pra
RAINIERI ALBA
1930 Jan 11 F ASLTRAS000223824
Acc: 1769114
2012 Jan 28
Acq Tm: 11:27:27.15

352 x 277

L_a

DFOV: 37.5 x 37.5cm

1.5T PHILIPS-1828653
Ex: 1343907
PDW_SPAIR
Se: 601/5
Im: 16/34
Ax: S7.8 (COL)

Mag: 1.1x

R_i

ET: 20
TR: 3789.6
TE: 30.0
SENSE-Body
4.5thk/1.0sp
Id:DCM / Lin:DCM / Id:ID
W:596 L:343

A

Poliambulatorio Dalla Rosa Pra
RAINIERI ALBA
1930 Jan 11 F ASLTRAS000223824
Acc: 1769114
2012 Jan 28
Acq Tm: 11:36:05.3

344 x 277

P

DFOV: 36.9 x 36.9cm

Donna di 82aa con clinica + per borsite:
lesione muscolare glutea dopo caduta accidentale

TRATTAMENTO

- FANS per os e topici
- Terapia fisica
 - Ultra-Suoni mobili
 - Onde d'Urto
- Terapia infiltrativa
 - Corticosteroidi
 - Fattori di crescita autologhi (gel piastrinico)

Ultra suoni

Onde d'urto

BORSITE ILEOPSOAS

Il muscolo ileo psoas è il maggior flessore dell'anca. Esso origina dalle vertebre lombari (psoas) e della parte interna dell'ileo (muscolo iliaco) si inserisce sul piccolo trocantere.

Dietro il tendine dell'ileo psoas è situata la borsa ileo pettinea, che circonda a semicerchio il tendine e può diventare sede di infiammazione, sia singolarmente che in associazione con il tendine dell'ileo psoas.

borsa piu' grande del corpo umano

DIAGNOSI

CILINICA: Esame Obiettivo ed Anamnesi

dolore alla palpazione in corrispondenza dell'inserzione del tendine sul femore (molto difficile da evidenziare soprattutto in un soggetto muscoloso/grasso).

sensazione (soggettiva) di tensione e un gonfiore all'inguine.

dolore, massa palpabile, sindrome da compressione sulla vena e nervo femorali con neuropatia ed edema periferico.

STRUMENTALE:

RX

ECOGRAFIA

RMN

RX STANDARD

ECOGRAFIA

borsite

RMN

BACCHI FRANCA
68S,F,22791
SI:6
Pos:23,00 mm
N. richiesta: 34771
Tra
Ec:1
Fr:1
Pos. paziente: HFS
Desc. studio: RMN COXOFEMORALE E
Desc. serie: STIR_TSE
< 401 - 6 >

Con perdita
27/01/2009,11.13.19

P. Dalla Rosa Prati
LF 4,00 mm
125% Pixel

borsite

TRATTAMENTO

- Riposo
- FANS per os e topici
- Terapia fisica
 - LASER
 - Ultra-Suoni mobili
- Aspirazione - infiltrativa
 - Corticosteroidi

OSTEITE PUBICA: PUBALGIE

La pubalgia o sindrome retto-adduttoria è una tendinopatia inserzionale a carico dei muscoli adduttori e/o dei retti addominali.

Si manifesta con dolore localizzato a livello inguinale con irradiazione alla regione adduttoria e a livello retto-pubico.

Nelle fasi avanzate si associa un artropatia della zona inserzionale pubica e della sinfisi stessa.

DIAGNOSI

CILINICA: Esame Obiettivo ed Anamnesi

dolore alla palpazione in corrispondenza dell'inserzione dei tendini a livello dell'inserzione pubica

dolore all'adduzione dell'arto contro resistenza e tensione muscolare

STRUMENTALE:

RX

ECOGRAFIA

RMN

RX STANDARD

Alterazioni osso

ECOGRAFIA

Lesione adduttore
lungo

RMN

Edema osseo pubico

TRATTAMENTO

- Riposo
- FANS per os e topici
- Terapia fisica
 - Ipertermia
 - Onde d'urto
- Terapia infiltrativa
 - fattori di crescita autologhi (PRP)

GRAZIE