SONNO E ALIMENTAZIONE

Liborio Parrino
Centro di Medicina del Sonno
Dipartimento di Neuroscienze
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Aristotele

durante la digestione si formano vapori che salgono alla testa;
man mano che il cervello si raffredda i vapori si condensano,
fluiscono verso il basso e raffreddano il cuore,
ritenuto il centro sensoriale del corpo.

i

Temperatura – Alimentazione – Ciclo sonno veglia

Nocturnal Eating Syndrome in Adults

*Maria Cristina Spaggiari, †Franco Granella, *Liborio Parrino,
‡Carlo Marchesi, ‡Ilaria Melli and *Mario Giovanni Terzano

Sleep, 20(9):734–738
© 1997 American Sleep Disorders Association and Sleep Research Society

Nocturnal Eating: Prevalence and Features in 120 Insomniac Referrals

Raffaele Manni, Maria Teresa Ratti and Amelia Tartara

Neurological Institute “C. Mondino”, University of Pavia, Italy

Sex	Age	BMI ^a	Clinical features	Promoting events	Predisposing factors	Associated complaints	Drugs
M	44	30.3	Two to three eating episodes per night with a marked sweet food election lasting 9 months. Normal diurnal food intake.	Diet	—	Chronic insomnia	Chronic intermittent use of benzodiazepines (10 years); discontinuous use of antidepressants (10 years)
F	45	23	Four to seven eating episodes per night lasting 10 years.	Traumatic life event	—	Daytime fatigue	—
M	46	39.5	Diurnal hyporexia. Three to four eating episodes per night lasting 16 years. Normal diurnal food intake.	—	Peptic ulcer	—	—
F	23	22.2	Three eating episodes per night with a marked sweet food election lasting 5 years.	—	Poor sleep hygiene	Daytime sleepiness, sleep attacks and fragmented nocturnal sleep (lasting 10 years)	—
F	30	23.2	Diurnal hyporexia. Two to three eating episodes per night with obessional behaviors and a marked sweet food election lasting 5 years. Diurnal hyporexia.	Delivery	—	—	—

F	49	28.5	Two to three eating episodes per night lasting 2 years. Diurnal overeating.	Traumatic life event	—	Chronic insomnia (lasting 2 years)	—
F	32	32.1	Eight to ten eating episodes per night with a marked sweet food election lasting 10 years. Diurnal hyporexia.	Traumatic life event	—	Sleep disruption and daytime fatigue	—
M	62	31.5	Two eating episodes per night lasting 10 years. Normal diurnal food intake.	Shift work	Drug-induced gastritis; nightwork	Daytime fatigue	Chronic intermittent use of benzodiazepines (15 years)
M	40	24.2	Two to three eating episodes per night with a mild sweet food election lasting 10 years. Normal diurnal food intake.	Traumatic life event	Ernia jatus	Chronic insomnia (lasting 10 years)	Chronic intermittent use of benzodiazepines (10 years)
F	40	28.8	Two to three eating episodes per night with a marked sweet food election lasting 5 years. Diurnal overeating.	Traumatic life event	Poor sleep hygiene	Chronic insomnia (lasting 5 years)	—

DSM-IV

- **Bulimia**
- **Disturbo del comportamento alimentare (binge eating)**

TABLE 2. *Psychiatric investigations*

Patient	Clinical evaluation (DSM-III-R)	MMPI	EAT-26 ^a	HRS ^b	HRSA ^c
1	Panic disorder with agoraphobia, major depression	Hysteria, depression, schizophrenia	Normal	21	100
2	Generalized anxiety disorder	nd ^d	Normal	nd	nd
3	Panic disorder with agoraphobia	nd	Normal	nd	nd
4	Normal	Depression, hypochondria, psychastenia	Normal	14	49
5	Generalized anxiety disorder	Hysteria, paranoia, social introversion	Normal	15	68
6	Panic disorder	nd	Normal	nd	nd
7	Agoraphobia without panic disorder	Hysteria, depression, psychastenia	Normal	20	116
8	Panic disorder with agoraphobia, dysthymia	Depression, hysteria, schizophrenia	Normal	20	60
9	Panic disorder	Depression, hysteria, psychastenia	Normal	29	37
10	Agoraphobia without panic disorder	Depression	Normal	16	40

^a EAT-26 = Eating Attitude Test (short version).

^b HRS^b = Hamilton Rating Scale for Depression (normal values ≤ 15).

^c HRSA = Hamilton Rating Scale for Anxiety (normal values ≤ 50).

^d nd = not done.

CNP

	NES (seven subjects)	Binge (three subjects)	Aspecific nocturnal eating (eight subjects)
Number of subjects eating during PSG	7	3	3
Number of eating episodes/night	mean 4.0 range 2-7	2.5 1-3	1.5 0-2
Eating latency (minutes)	mean 2.0 range 1-3	14.5 8-20	16.3 12-24
Sleep latency after eating (minutes)	mean 3.0 range 2-5	6 5-7	7 5-8

TABLE 6. *Clinical features common to all 10 patients*

- A. A complaint of difficulty in maintaining sleep
- B. Frequent and recurrent awakenings to eat or drink
- C. Food-seeking drive described as urgent abnormal need to swallow food with absence of real hunger
- D. Compulsive feeding behavior
- E. Food peculiarity (always edible substances)
- F. Inability to return to sleep without eating
- G. Full waking during the episodes and clear recall of them in the morning
- H. Polysomnographic evidence of low sleep efficiency index and high number of awakenings
- I. Strict relation between nocturnal episodes and NREM sleep
- J. Short "eating latency" and quick return to sleep after eating
- K. No medical, hormonal or neurological disorders
- L. Absence of bulimia or anorexia nervosa

CASO CLINICO

- **45 anni – F – impiegata**
- **Insonnia intermedia (risvegli multipli con fame compulsiva per sostanze commestibili soprattutto dolci)**
- **Ad ogni episodio notturno, ingerisce quantità “industriali” di briosche, nutella, biscotti**
- **Dopo l’abbuffata si riaddormenta**
- **Scosse alle gambe durante il sonno (riferite dal bedpartner)**
- **Ricordo al mattino degli episodi notturni**
- **Astenia diurna e sonnolenza pomeridiana**
- **Aumento di peso ma poco appetito di giorno**
- **Se mangia di più a cena non modifica il comportamento notturno**
- **Non manovre purgative**
- **Non disturbi psichiatrici presenti o pregressi**

CASO CLINICO (D.D. e Terapia)

PSG

- **Aumento dei WASO**
- **Riduzione del sonno non-REM**
- **Risvegli (improvvisi) sempre in sonno non-REM**
- **Aumento del CAP rate per la presenza di PLM**

Diagnosi Differenziale

- **Sonnambulismo (parasonnie)**
- **Time-killing in insonnia**
- **Bulimia**
- **Disturbo del comportamento alimentare (binge eating)**

Trattamento

- **Trazodone, dopamino-agonisti**
- **SSRI (fluvoxamina)**
- **Topiramato**

SLEEP RELATED EATING DISORDER
(PARASOMNIA)

NES: run to the fridge...

RLS / PLM

bruxismo

fumo

SONNAMBULISMO: incoscienza

non sempre cibo o sostanze commestibili

non ricordo al mattino

INSONNIA: passatempo (time-killing activity)

DISTURBI DEL RITMO CIRCADIANO: spostamento orari

NARCOLESSIA: snack ogni 3-4 ore

MACROSTRUTTURA DEL SONNO

PSG NARCOLESSIA

Orexina (carente nella narcolessia)

ormone neuropeptidico che stimola lo stato di veglia e l'appetito
attiva il grasso bruno e aumenta il dispendio energetico

La restrizione di sonno è associata ad una significativa riduzione della **leptina** (ormone della sazietà prodotto dal tessuto adiposo) e ad un aumento della **grelina** (ormone dell'appetito prodotto dallo stomaco)

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS)

- Eventi respiratori ripetitivi nel sonno
- Gli eventi sono interrotti da un microrisveglio

TRACCIATO DI SONNO STADIO 2 CON APNEE

Apnea-Ipopnea Index (AHI)

Si basa sul numero totale interruzioni complete (APNEE) o parziali (IPOPNEE) del respiro per ORA di sonno.

Queste pause respiratorie devono durare almeno 10 secondi e in genere si associano a una desaturazione di ossigeno nel sangue.

Indice utilizzato per stabilire l'entità della sindrome delle apnee notturne.

AHI tra 5 e 14: sindrome lieve
AHI: tra 15-30: sindrome moderata
AHI: > 30: sindrome grave

**QUESTA VALUTAZIONE SI PUO' FARE SOLO
CON LA POLISONNOGRAFIA**

Normal Subject

Soft Palate

Tongue

Mandible

Apneic Patient

Soft Palate

Tongue

Mandible

Flow

Breathing effort

Thorax

Abdomen

Brainwave activity

Sleep

Noise level

Heart rate

58 bpm

Blood oxygen

95 %

Menu

Flow

Breathing effort

Thorax

Abdomen

Brainwave activity

Sleep

Noise level

Heart rate

52 bpm

Blood oxygen

91 %

Menu

Gli studi epidemiologici hanno evidenziato che l'OSAS si associa in alta percentuale di casi, oppure è un importante fattore di aggravamento o di rischio per :

- Insufficienza respiratoria
- Ipertensione arteriosa sistemica: in particolare l'OSAS può essere responsabile del mancato calo fisiologico della pressione arteriosa ("dipping") notturna, ma anche dello scarso controllo farmacologico dell'ipertensione arteriosa, L'80% dei pazienti con ipertensione farmaco-resistente presenta disturbi respiratori nel sonno.
- Cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco
- Aritmie cardiache e fibrillazione atriale
- Patologie cerebrovascolari
- Sindrome Metabolica
- Alterazione dei fattori di coagulazione in senso trombofilico

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS)

Up to 83% of patients with type 2 diabetes suffer from unrecognized OSAS and increasing severity of OSAS is associated with worsening glucose control

EXPIRATORY RESISTANCE

AIRFLOW

NOSEMASK

**MOUTH NOT
OBSTRUCTED**

CPAP 92.98s 92.9
 23.50.80 23.51.00 23.51.20 23.51.30 23.51.40 23.52.00 23.52.10

EEG

42.0pV/cm
 Subm
 0
 pV

Flow
 0
 mH2O

Thorax
 0
 pV

SpO2 - %
 100
 98
 96
 94

Ile - bp
 98
 96
 94

Ile dx
 0
 pV

**Resistenza al
collasso**

Resistenza al risveglio

INSTABILITA' NEURO-VEGETATIVA

Fig. 1. Schematic diagram of the integrative model of cardiovascular and respiratory interactions with sleep-wake state control.

XXXII CONGRESSO NAZIONALE AIMS

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA DEL SONNO

"PER UNA MEDICINA DEL SONNO SOSTENIBILE"

PARMA, 21 - 24 OTTOBRE 2012

Centro Congressi - Camera di Commercio

DOMENICA 21 OTTOBRE

MEDICI DI BASE E SPECIALISTI INCONTRANO ESPERTI DEL SONNO SUI PROBLEMI DELLA MEDICINA DEL SONNO NELLA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA

Accreditamento Ecm dedicato

Moderatori: M.G. TERZANO - L. PARRINO

09,00-09,30	Fisiologia del sonno (con accenno ai disturbi del ritmo e ai problemi di sonnolenza alla guida e sul lavoro) - M. C. SPAGGIARI
09,30-09,50	Le insonnie - A. CICOLIN
09,50-10,20	Terapia delle insonnie (farmaci e CBT) - E. BONANNI
10,20-10,40	OSAS e sue terapie - M. BOSI
10,40-11,00	Terapia chirurgica di russamento ed apnee - S. FRASSINETI
11,00-11,20	Le ipersonnie e loro terapie - F. PROVINI
11,20-11,40	Disturbi del movimento in sonno e parasonnie - L. FERINI STRAMBI
11,40-12,00	Medicina di Genere e accenno ai disturbi del sonno in pediatria - R. SILVESTRI
12,00-13,00	Discussione Casi clinici (divisione in gruppi di lavoro)

TRACCIATO DI SONNO STADIO 2 CON APNEE