

INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA ANZIANI_2012

Farmaci da evitare	Farmaci raramente appropriati	Farmaci da usare solo per alcune condizioni
<p>Analgesici Pentazocina</p> <p>Anti-aritmici Disopiramide</p> <p>Anti-infiammatori FANS (>15 giorni) Indometacina Ketorolac iniettabile (max 2 gg)</p> <p>Anti-parkinson Orfenadrina cloridrato</p> <p>Sistema cardiovascolare Clonidina (compresse) Metildopa Nifedipina a breve durata d'azione Spironolattone >25mg/die</p> <p>Sistema endocrino Estrogeni (sistemici) Metiltestosterone</p> <p>Sistema nervoso centrale Amitriptilina Citalopram >20mg/die Clorpropamide Escitalopram >10mg/die</p>	<p>Anti-aggreganti Ticlopidina</p> <p>Anti-secretivi Inibitori di pompa (≥ 12 mesi)</p> <p>Anti-depressivi Fluoxetina</p>	<p>Antiaritmici Amiodarone Diidrochinidina Chinidina Dronedarone Flecainide Propafanone Sotalolo</p> <p>Antipsicotici atipici: Risperidone Quetiapina Olanzapina Clozapina Aripripazolo Paliperidone Ziprasidone</p> <p>Antipsicotici convenzionali: Aloperidolo Amisulpiride Clorpromazina Clotiapina Flufenazina Perfenazina Pimozide Promazina Sulpiride Trifluoperazina</p> <p>Sistema cardiovascolare Clonidina (cerotti) Digossina Doxazosina</p>

