90 anni di
PREVENZIONE
2012

LILT

LIGA ITALIANA
PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI

ASPETTI CLINICI DEL CARCINOMA ORALE

**Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri**

PARMA, 19 NOVEMBRE 2013

Paolo Vescovi

Direttore EMDOLA (European Master
Degree on Oral Laser Applications)

Responsabile Ambulatorio di Patologia e
Chirurgia Orale Laser-Assistita

Università degli Studi di Parma

EUROPEAN MASTER DEGREE: ORAL LASER APPLICATIONS

CARCINOMA ORALE

**Porzione INFERIORE del cavo orale
è colpita 4 volte in più della superiore**

Labbro inferiore 35%
Lingua 22%
Pavimento orale 17%
Palato molle/orofaringe 15%
Mucosa geniena 10%
Gengiva / cresta alveolare 6%
Palato duro 5%
Vestibolo 1%

CARCINOMA ORALE

ANCHE LA PORZIONE SUPERIORE può essere colpita !!!!

ATTENZIONE!!!

ANCHE LA PORZIONE SUPERIORE può essere colpita !!!!

CARCINOMA ORALE

**10% è MULTIFOCALE
10-20% è
MULTICENTRICO
(sincrono o metacrono)
Orale 50%
VADS 45%
Non VADS 5%**

**20-30% dei casi
chi ha sviluppato ca VADS ha il
RISCHIO DI SVILUPPO II TUMORE**

10% è MULTIFOCALE
10-20% è
MULTICENTRICO
(sincrono o metacrono)
Orale 50%
VADS 45%
Non VADS 5%

**10% è MULTIFOCALE
10-20% è
MULTICENTRICO
(sincrono o metacrono)
Orale 50%
VADS 45%
Non VADS 5%**

Varianti cliniche del CARCINOMA ORALE

- **CARCINOMA INIZIALE (early cancer): carcinoma in situ / carcinoma microinvasivo**
- **CARCINOMA INVASIVO / INFILTRANTE**

Early cancer – carcinoma iniziale

• **CARCINOMA IN SITU**

- Displasia grave - OIN 3: alterazioni in tutto lo spessore dell' epitelio con mitosi e mostruosità cellulari in superficie
- NON superamento della membrana basale
- NON metastasi
- Regressione spontanea all' eliminazione dei fattori di rischio identificati SI/NO (?)

Carcinoma *in situ*

- Indistinguibile da lesioni precancerose
- Leucoplachia
- Eritroplachia
- Eritroleucoplachia /leucoeritroplachia
- lichen planus e lesioni lichenoidi
- Qualsiasi sede delle sopracitate lesioni

Early cancer – carcinoma iniziale

- **CARCINOMA MICROINVASIVO**

- Superamento della membrana basale
- Microinvasione: < 3 mm
- Raramente provoca metastasi infonodali

Early cancer – ca microinvasivo

- Dimensioni < 2 cm (T1 N0)
- Possibili lesioni multiple
- Può avere “aspetto innocente”, cioè mimare lesioni infiammatorie

Early cancer: insorto su lesioni precancerose

**LESIONE
BIANCA**

Early cancer: insorto su lesioni precancerose

**LESIONE
ROSSA**

Early cancer: insorto su lesioni precancerose

**LESIONE MISTA
BIANCO-ROSSA**

Early cancer: insorto su lesioni precancerose

**LESIONE
LICHENOIDE**

AM, ♀ anni 54

- LP cutaneo-genitale (diagnosi dermatologica da 15 anni)
- OLP / OLL?
- si fumo no alcool

mercoledì 12 febbraio 14

ATTENZIONE!!!

**IL CARCINOMA PUO' INSORGERE
SU MUCOSA SANA !!!!**

Early cancer: NON insorto su lesioni precancerose

**Piccola erosione
Lesione granuleggiante /crostosa**

Early cancer: NON insorto su lesioni precancerose

**Placca-nodulo
con/senza erosione**

Early cancer: NON insorto su lesioni precancerose

**Ulcerazione circondata
da cercine rilevato**

SEGNI E SINTOMI : CARCINOMA INIZIALE

SEGNI E SINTOMI : CARCINOMA INIZIALE

SEGNI E SINTOMI : CARCINOMA INIZIALE

- asintomatico o paucisintomatico
- senso di presenza della lesione
- a volte sanguinamento
- EFFETTUARE SEMPRE PALPAZIONE: indurimento in periferia

SEGNI E SINTOMI : CARCINOMA IN FASE INTERMEDIA

SEGNI E SINTOMI : CARCINOMA IN FASE INTERMEDIA

- dolore frequentemente riferito
- sanguinamento
- difficoltà ad indossare le protesi
- possibile coinvolgimento linfonodale
- **EFFETTUARE SEMPRE PALPAZIONE: indurimento e fissità sui piani profondi**

SEGNI E SINTOMI : CARCINOMA IN FASE AVANZATA

- ◆ invasione dei tessuti limitrofi
- ◆ mobilità e perdita dei denti
- ◆ dolore sempre presente
- ◆ possibile presenza di infezioni

CARCINOMA: CLINICA/ISTOLOGIA

- **CARCINOMA
INVASIVO /
INFILTRANTE**

- Invasione di strutture adiacenti (muscoli, nervi, vasi, cute, periostio e osso)
- Elevatissima percentuale di metastasi linfonodali e a distanza

mercoledì 12 febbraio 14

mercoledì 12 febbraio 14

mercoledì 12 febbraio 14

CARCINOMA NON INIZIALE INVASIVO/INFILTRANTE

- **SINTOMATOLOGIA:**
 - Algie lievi (provocate da contatto con alimenti, confricazione, fonazione etc.)
 - Bruciore (spontaneo)
 - Sanguinamento
 - Fastidio meccanico
 - Disfagia a solidi
 - Disfagia a liquidi
 - Alterazioni funzionali
 - Disfonia

CARCINOMA NON INIZIALE INVASIVO/INFILTRANTE

- **SINTOMATOLOGIA:**

- Algie lievi (provocate da contatto con alimenti, confricazione, fonazione etc.)
- Bruciore (spontaneo)
- Sanguinamento
- Fastidio meccanico
- Disfagia a solidi
- Disfagia a liquidi
- Alterazioni funzionali
- Disfonia

AUMENTO

mercoledì 12 febbraio 14

mercoledì 12 febbraio 14

IN CONCLUSIONE: ISPEZIONE

- Ricordarsi che il cancro... non vi chiama !!!
- Ispezionare e palpare le zone poco visibili
- Utilizzare 2 specchietti o abbassalingua
- Spostare la lingua con una garza

mercoledì 12 febbraio 14

mercoledì 12 febbraio 14

mercoledì 12 febbraio 14

ATTENZIONE alle “LESIONI DA PROTESI”!!!

Raddoppio delle
dimensioni in una
settimana dopo la
biopsia

ATTENZIONE alle “AFTE” !!!

ATTENZIONE alle "AFTE" !!!

AFTA

Carcinoma

Carcinoma

AFTA

mercoledì 12 febbraio 14

ATTENZIONE alle TUMEFAZIONI DEL COLLO in coincidenza con lesioni orali!!!

**ATTENZIONE a chi ha già
avuto un carcinoma VADS!!!**

ATTENZIONE a chi ha già avuto un carcinoma VADS!!!

ATTENZIONE al "TRAUMA" !!!

mercoledì 12 febbraio 14

mercoledì 12 febbraio 14

mercoledì 12 febbraio 14

ATTENZIONE al “TRAUMA” !!!

ATTENZIONE al "TRAUMA" !!!

ATTENZIONE al "TRAUMA" !!!

ATTENZIONE al "TRAUMA" !!!

CARCINOMA

ATTENZIONE al "TRAUMA" !!!

CARCINOMA

ULCERA TRAUMATICA

IN CONCLUSIONE: ATTENZIONE A QUELLO CHE NON DOVREBBE ESSERCI O CHE NON HA UNA SPIEGAZIONE RAZIONALE !!

- **ATTENZIONE ALLE LESIONI CHE NON GUARISCONO**
- le lesioni traumatiche migliorano in pochi giorni e guariscono totalmente dopo 15 giorni dalla rimozione dei fattori irritanti
- le afte guariscono al massimo dopo tre settimane
- le carenze vitaminiche sono rarissime nelle nostre zone
- ...il “riscaldo” non esiste !

IN CONCLUSIONE: ATTENZIONE A QUELLO CHE NON DOVREBBE ESSERCI O CHE NON HA UNA SPIEGAZIONE RAZIONALE !!

- **ATTENZIONE ALLE LESIONI CHE NON GUARISCONO**
- le lesioni traumatiche migliorano in pochi giorni e guariscono totalmente dopo 15 giorni dalla rimozione dei fattori irritanti
- le afte guariscono al massimo dopo tre settimane
- le carenze vitaminiche sono rarissime nelle nostre zone
- ...il “riscaldo” non esiste !

LILT

LIGA ITALIANA
PER LA LORO
CONSAULENZA

LA TUA BOCCA NON
E UN DETTAGLIO

LA TUA BOCCA NON
È UN DETTAGLIO

LUIGI PIRANDELLO

L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA

a cura di Gerardo Mastrullo

introduzione di Luigi Lunari

...Guardi, qua,
sotto questo
baffo... qua, vede
che bel tubero
violaceo? La
morte, capisce? è
passata. M'ha
ficcato questo
fiore in bocca...”

Elisabetta Merigo

Maddalena Manfredi

Paolo Vescovi

Marco Meleti

**AMBULATORIO DI PATOLOGIA E CHIRURGIA
ORALE LASER-ASSISTITA
Polo di Odontostomatologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma**

Carlo Fornaini

Luigi Corcione

Tamara Simonazzi

Giovanni Mergoni

Amin Sarraj

EMDOLA
EUROPEAN MASTER DEGREE: ORAL LASER APPLICATIONS

MASTER DI SECONDO LIVELLO IN CHIRURGIA E PATOLOGIA ORALE

paolo.vescovi@unipr.it

EMDOLA
EUROPEAN MASTER DEGREE: ORAL LASER APPLICATIONS

**MASTER DI SECONDO LIVELLO IN
CHIRURGIA E PATOLOGIA
ORALE**

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

paolo.vescovi@unipr.it